



# Datos

# C

# Sencillos

## ¡Advertencia sobre la Ribavirina!

La ribavirina es una pastilla o cápsula que se toma con otros medicamentos para tratar la hepatitis C (VHC o Hep C para abreviar).

Los principales efectos secundarios de la ribavirina son las erupciones cutáneas y la anemia (escasez de glóbulos rojos). También puede empeorar los problemas de

corazón y riñón.

Además, la ribavirina puede causar **defectos congénitos en el feto**. Consulte a su médico para seguir dos métodos anticonceptivos eficaces. Además, las mujeres deben hacerse una prueba de embarazo antes, durante y seis meses después del tratamiento.

*La buena noticia es que es seguro quedarse embarazada 6 meses después de terminar el tratamiento contra el VHC.*

## Recuerde...

- ◆ En caso de ser **hombre** y estar tomando ribavirina, usted y su compañera sexual deben usar dos tipos de métodos anticonceptivos eficaces. Su compañera deberá hacerse una prueba de embarazo antes, durante y 6 meses después del tratamiento.
- ◆ En caso de ser **mujer** y estar tomando ribavirina, usted y su compañero deben usar dos tipos de métodos anticonceptivos eficaces. Además, deberá hacerse una prueba de embarazo antes, durante y 6 meses después del tratamiento.

Asegúrese de informar a su médico y enfermera si tiene algún problema de corazón o riñón.

[www.hcvadvocate.org](http://www.hcvadvocate.org)